

#### 4. Übungsblatt

### LINEARE ALGEBRA I (WS 2004/05)

**Abgabe: Do. 11.11.2004, bis 13.00 Uhr**

Gruppen 1–3 : Fach Nr. 11 (orangener Schrank Ebene D1)

Gruppen 4–5 : Fach Nr. 13 (orangener Schrank Ebene D1)

Schreiben Sie auf die erste Seite **gut** leserlich Namen, Vornamen, Matrikel-Nr. und Nr. Ihrer Übungsgruppe. Heften Sie die Seiten zusammen!

**9. Aufgabe:** In Aufgabe 2 wurde bewiesen: Zu beliebigen ganzen Zahlen  $a$  und  $n$  mit  $n > 0$  gibt es ganze Zahlen  $q$  und  $r$  mit folgenden Eigenschaften

$$a = qn + r \quad \text{und} \quad 0 \leq r < n$$

(Diese Zahlen  $q$  und  $r$  sind dadurch sogar eindeutig bestimmt). Man bezeichnet diesen Sachverhalt als “Division mit Rest in  $\mathbb{Z}$ ” und nennt  $r$  den “Rest bei Division von  $a$  durch  $n$ ”. Man schreibt auch  $r =: a \bmod n$ .

Auf der Menge  $\mathbb{Z}_n := \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$  seien eine Addition  $\oplus$  und eine Multiplikation  $\odot$  definiert durch

$$x \oplus y := (x + y) \bmod n \quad , \quad x \odot y := (x \cdot y) \bmod n \quad (x, y \in \mathbb{Z}_n)$$

Beweise:

- a)  $(a + kn) \bmod n = a \bmod n$  für alle  $a, k \in \mathbb{Z}$
- b) Für  $\oplus$  gilt das Assoziativ-Gesetz
- c)  $x \oplus 0 = x$  für alle  $x \in \mathbb{Z}_n$
- d) Zu  $x \in \mathbb{Z}_n$  existiert ein  $y \in \mathbb{Z}_n$  mit  $x \oplus y = 0$
- e) Gibt es zu  $2 \in \mathbb{Z}_{14}$  ein  $x \in \mathbb{Z}_{14}$  mit  $2 \odot x = 1$ ? (Die Antwort ist zu begründen!) (5)

**10. Aufgabe:**  $M, N, P$  seien Mengen.

- a) Beweise:  $(M \cap N) \cup P = M \cap (N \cup P) \iff P \subseteq M$
- b) Welche Teilmengenbeziehung gilt zwischen den Mengen  $(M \setminus N) \setminus P$  und  $M \setminus (N \setminus P)$ ? Müssen sie gleich sein? Begründe alle Antworten. (4)

**11. Aufgabe:** Seien  $r, s \in \mathbb{R}$  und  $\vec{v}$  ein Vektor im Anschauungsraum  $A$ . Beweise nur unter Verwendung von (4.1) und (4.2) mit genauer Angabe der benutzten Rechenregeln:

- a)  $\vec{v} + \vec{v} = \vec{v} \implies \vec{v} = \vec{o}$
- b)  $r\vec{o} = \vec{o}$
- c)  $0\vec{v} = \vec{o}$
- d)  $r\vec{v} = \vec{o} \implies (r = 0 \vee \vec{v} = \vec{o})$
- e)  $-(r\vec{v}) = (-r)\vec{v}$
- f)  $r\vec{v} = s\vec{v} \implies (r = s \vee \vec{v} = \vec{o})$  (5)